

**Unterstreiche die entsprechenden Sätze mit den angegebenen Farben!**

Verstauchungen	rot
Verrenkungen	blau
Knochenbrüche	schwarz
Rachitis	grün
Gelenkentzündung	braun

Brüche entstehen durch Schlag oder Sturz.

Sie entstehen durch Ueberdehnung der Gelenkbänder und der Gelenkkapsel.

Durch Kalkmangel und vitaminarme Nahrung können bei Kindern weiche Knochen und Wachstumsstörungen entstehen.

Gelenkkapsel und Gelenkbänder werden zerrissen.

Durch gewisse Krankheiten oder eitrige Zähne kann es zu Schädigungen der Gelenke kommen.

Das hat Verbiegung der Knochen und der Wirbelsäule zur Folge.

Verursacht der Bruch eine offene Wunde, so handelt es sich um einen offenen Bruch.

Die Gelenkknochen kehren wieder in ihre normale Stellung zurück.

Die Knochen verschieben sich beim Gelenk.

Bei Splitterbrüchen sind die Knochen in mehrere Teile zerbrochen.

Arge Schmerzen und Bewegungsunfähigkeit können die Folge sein.

Das Einrenken muss vom Arzt vorgenommen werden.

Das Gelenk schwillt stark an und verursacht Schmerzen bei der Bewegung.

Obst- und Gemüsesäfte, viel Licht und frische Luft verhindern diese Krankheit.

Besonders gefährlich ist der Bruch der Wirbelsäule und der Schädeldecke (Schädelbruch).

Ruhe und kalte Umschläge lindern die Schmerzen.

Diese Krankheit kann mit Moor- und Schwefelbädern behandelt werden.